

雑 録 Miscellaneous

○にはふぢノ白花品

黒川喬雄氏が伊賀國阿山郡新居村デ自生品ヲ採集草木研究會宛送り越サレタノデ學名ヲ調ベタ處下記ノ如クスルノガヨイトワカツタ。和名ハ變バエガシナイガ **しろばなにはふぢ** (新稱) トシタ。歐米デハ前カラ植エテ居ル。 (前川 文 夫)

Indigofera incarnata NAKAI forma *alba* (SARGENT) F. MAEKAWA, stat. nov.

Indigofera decora var. *alba* SARGENT in Garden & Forest, 7: 376 cum fig. 61 (1894), REHDER, Manual: 500 (1927).

Hab. Japonia, Honshū: prov. Iga, oppido Arai (T. KUROKAWA, No. 57, Jun. 3. 1937). (F. MAEKAWA)

○しろばなはぎノ自生地カ

同ジク黒川喬雄氏カラノ送品ニ伊賀上野町地内デ採集ノ *Lespedeza japonica* BAILEY ガアッタ。本種ハ廣ク家植トナツデ居ル大形ノ白花ヲ開ク見事ナ萩デアルガ、中井先生ガ朝鮮デ自生ヲ採集サレタ以外、内地デハマダ耳ニシナイ。黒川氏ハ野生品ト記シタノデ、コレガ自生ナラバ内地デノ自生地ノ一ツヲ捕ヘタコトニナリ又該地方ニハ他所デモ發見出來ヨウト思ハレルノデ一筆記ス。 (前川 文 夫)

○とげなしうこぎ

うこぎノ全ク刺ノ無イ變種デアル。伊賀名賀郡箕面村中知山ニ産シ、黒川喬雄氏ノ採集ニカ、ル。同氏ニヨレバ昭和5年頃ニ同地方デ採集會ガ催サレタ折ニ、牧野先生ガ上記ノ和名ト *Acanthopanax spinosum* MIQUEL var. *inermis* MAKINO ノ學名トヲ殘サレタ儘ニナツテ居ルト云フノデ、同先生ノ御許シヲ得テコ、デ記載ヲ一言添ヘテ有效名トスル。

(前川 文 夫)

Acanthopanax spinosum MIQUEL var. *inermis* MAKINO schedl. in Herb.

Rami inermes. Foliola obovata obtusiuscula margine crenata.

Nom. Jap. *Togenasi-ukogi* (T. MAKINO, nom. nov.)

Hab. Japonia, Honsyū: prov. Iga, oppido Minōwa, Nakati-yama (T. KUROKAWA No. 52—Jun. 5, 1937—Typus). (F. MAEKAWA)

○ひめかぢいちごガ伊豆七島ニ出現

本種 (*Rubus Yatabei* FOCKE) ニ關シテハ本誌 (6: 318, 9: 173) ニ久内清孝氏ノ記事ガアツテ委細ガワカル。コレハ同氏モ述ベラレタ様ニ **かぢいちご** × **にがいちご** ト思ハレルガ、雜種トシテ見レバ、兩種間ニ出來ル第一代ガ時ト處ヲ異ニシテ居ル場合ニビツタリ—

致シタ形ヲ作り得ルトハ限ナライカラ久内氏ノ述ベラレタ如ク二形ガアルモノデアラウカ。ソレハソレトシテ本種ハ東京カラ伊豆ヘカケテ分布スルノデアルガ、今回伊豆七島中ノ三宅島神着村デ林憲氏ニ依リ採集サレタノヲ草木研究會宛ノ標品デ知ツタ。面白イ事ニ、伊豆地方ニアル形 (即チ久内氏ノ Fig. 2) デハナクテ東京ニ産スル形 (Fig. 1) デアツタ。

(前川 文夫)

○やなぎたでトぼんとくたで

歐洲ノ *Polygonum Hydropiper* L. ハ葉・葉鞘ハ無毛デ、苞ハ屢々縁毛ヲ缺キ、瘦果ハ卵狀橢圓形デ長サ 2.5—3.5 mm アル。我國ニモコレニヨク一致スル形モアルガ、やなぎたでト稱シテキルモノ、中ニハ、葉中肋上・葉鞘ニ伏臥剛毛ヲ布キ、葉鞘ハ比較的莖ニ密着シ、縁毛モ稍長ク、苞モ縁毛ヲ有シ、瘦果ハ卵圓形デ長サ 2 mm 許、葉ハ廣披針形デ兩端尖リ質ガ稍堅イモノガアル。コノ様ナ形ガアジアル事ハ、既ニ HOOKER fil. ガ Fl. Brit. Ind. V, p. 39 ノ *Polyg. Hydropiper* ノ項デ述ベテキル。併シ彼モ云ツテキル如ク、中間形ガアツテソノ區別ハ困難デアルガ、一方カカル形ハ歐洲ニハナイシ、最近黒川喬雄氏ガ草木研究會ニ送ラレタ標本ハ特ニ著シイ形デアルノデ變種トシテ分ケテオク。本州・四國・九州・小笠原島・朝鮮・臺灣等ニ散在シ、恐ラク *Polyg. Hydropiper* subsp. *microcarpum* DANSER ノ一部ヲナスモノデアラウ。草本圖説ノやなぎたでハ或ハコノ形ヲ指スコモ知レナイガハツキリシナイカラ **ざらつきやなぎたで** ノ新名ヲ與ヘル。

Persicaria Hydropiper (L.) SPACH var. *scabrida* HARA, var. nov.

Caulis erectus. Folia late lanceolata vel lanceolata utrinque attenuata rigiduscula ad venas medianas adpresse strigoso-pilosa. Ochreae subcompactae adpresse strigoso-pilosae margine ciliatae, ciliis 3-7 mm longis. Bractea vulgo ciliolata. Achenia lenticularia ovato-rotundata ca. 2 mm. longa.

Nom. Jap. *Zaratsuki-yanagitade* (nov.)

Typus. Honshu: prov. Iga: in oppido Mita-mura (T. KUROKAWA, no. 45-Aug. 29, 1937).

コノ形ハ又ぼんとくたでニモ似テクルガ、ぼんとくたでニ於テハ葉ハ概ネ橢圓狀又ハ卵狀披針形デ先端急ニ鋭尖頭ヲナシ、葉ヤ葉鞘ノ毛ハ更ニ多ク、縁毛モ一層長ク、花穂ハ瘦長デ疎花、花被ハ概ネ 5 裂、雄蕊ハ約 8 本、瘦果ハ多ク三稜形ヲナスノデ區別デキル。ぼんとくたでノ學名ニハ *Polygonum flaccidum* MEISNER ガヨク用ヒラレルガ、MEISNER ハ新種トシテ發表シタノデハナク、ROXBURGH, Fl. Ind. II, p. 291 ヲ引用シテキル。ROXBURGH ノ原記載ニハ “Leaves...with cordate base” 等トアツテ明カニぼんとくたでトハ別物デ、HOOKER fil. ニヨルト *Polyg. serrulatum* デアルトイフ。兎ニ角、コノ學名ハぼんとくたでニ用フル事ハデキナイ。STEWART ハ *Polyg. Donii* MEISNER ヲぼんとくたでノ多毛品ト見テキルガコレニハ尙疑ガアル。初メテ記載サレタノハ MEISNER, Monogr. Polyg. p. 72 (1826) デ、ソノ時花被ニ腺點ガアルト書イタカラトイフ STEWART ノ意見デアルガ、